

## ПАЛИТРА ПОЧВОПОКРОВНЫХ Цветущие ковры флокс

Флокс — одно из самых распространенных декоративных травянистых растений. Род *Phlox* сем. Polemoniaceae (Синоховые) включает в себя около 60 многолетних видов из Северной Америки и 1 — однолетний. Они очень разнообразны по жизненным формам: от плотных альпийских подушек и широких, распространяющихся во все стороны ковров до маленьких и больших прямостоячих растений, образующих более или менее плотные кусты с крупными соцветиями.

Хотя видовые отличия весьма существенны, все флоксы очень похожи по строению цветка: узкотрубчатый у основания, с 5 широко раскрытыми долями, которые могут быть забурены на концах и часто имеют контрастную окраску в горловине.

Самый знаменитый, конечно, — флокс метельчатый (*Phlox paniculata*), который летом так ценится за многообразие и яркость окрасок, неповторимый аромат. Существует и множество низкорослых почвопокровных видов весеннего цветения, которые тоже издавна любимы садоводами. Их можно разделить на две группы по использованию в саду.

Первая группа включает самые мелкие растения, образующие плотные подушки или низкие ковры. Некоторым из них (ф. Дугласа, ф. прелестный) необходим индивидуальный уход, и они применяются, главным образом, в любительских каменистых садах. Другие же (ф. шиловидный) менее прихотливы, разрастаются мощными коврами и практически не требуют ухода, за исключением редкой прополки и поливов в сильно засушливые годы. Они даже проявляют некоторую агрессивность в борьбе за существование.

**Флокс шиловидный** (*Phlox subulata*, син. *Phlox setacea*). Самый известный в садоводстве. Классическое подушковидное растение, родом с востока Северной Америки,

где обитает в светлых, несколько суховатых лесах. Побеги, сплошь покрытые короткими жесткими листьями, лежат на земле, сильно разветвляясь и образуя густые плотные подушки. Цветки (по 2-4 шт.) на коротких цветоносах (10-15 см) возвышаются над массой зелени. В полном цвету (май-июнь) растение представляет собой настоящую клумбу, ведь, разрастаясь, оно образует пятно диаметром до 50 см. В районах с мягкими зимами выходит из-под снега зеленым, в средней полосе возможно обмерзание наземных частей.

Первые экземпляры ф. шиловидного появились в Англии в 1796 г. Известный коллекционер Р. Фаррер назвал это событие необыкновенно счастливым для цветоводства.

Вид очень вариабелен и принимал активное участие в гибридизации. Из коллекции нашей фирмы рекомендуем следующие сорта.

'Атропурпуреа' ('*Atropurpurea*'). Низкорослый, темно-карминно-розовый с темным глазком.

'Ронсдорфер Шене' ('*Ronsdorfer Schone*'). Лососево-розовый.

'Лейхтштерн' ('*Leuchstern*'). Розовато-красноватый. Подушки очень густые.

'Майсшнее' ('*Maischnee*'). Считается лучшим белым сортом.

**Флокс Дугласа** (*Phlox douglasii*) произрастает на западе Северной Америки в высокогорьях, трещинах скал и на галечнике. Образует округлые, низкие, густооблиственные зимующие подушки высотой до 5 см. Стебли почти распростертые, листья жесткие, шиловидные, длиной до 1,5 см. Почти сидячие цветки, собранные в головки по 1-3 шт., лавандовые или розовые, но впоследствии выгорают почти до белых. Обильно цветет в мае-июне с небольшим повтором в августе. Разрастается медленно.

Флокс Дугласа очень распространен в каменистых садах Прибалтики, особенно в Литве. Хорош в маленьких альпинариях. В районах с более мягкой зимой неплохо смотрится как пристенное растение. При достаточном увлажнении эффектен в миксбордерах на первом плане.

Оба флокса внешне очень схожи, но ф. Дугласа цветет позже, более компактен. Немецкий садовод Г. Арендс вывел путем скрещивания с близкими видами сорта ф. Дугласа, которые растут значительно лучше и менее чувствительны к неблагоприятным погодным условиям, чем исходный вид. Мы испытываем следующие сорта.

'Апполо' ('*Appollo*'). Фиолетово-розовый, разрастается хорошо.

'Бутманс Вэрайти' ('*Boothman's Variety*'). Лавандовый с густо-голубым центром, старинный, любимец садоводов.

'Конкорд' ('*Concorde*'). Густо-красно-малиновый с голубовато-серым глазком.

'Крэкерджек' ('*Crackerjack*'). Вилколенный новый гибрид с блестящими розово-фиолетовыми цветками, очень компактный, обильноцветущий.

'Айсберг' ('*Iceberg*'). Превосходный белый.

'Келлиз Ай' ('*Kelly's Eye*'). Выдающийся новый сорт — бледно-розовый с красным глазком.

'Ред Адмирал' ('*Red Admiral*'). Вилколенный темно-малиновый.

'Вайолет Куин' ('*Violet Queen*'). Темно-фиолетовый, очень компактный,

**Флокс прелестный** (*Phlox amoena*). Родом из Флориды. Высота около 20 см. Образует закрытые, сомкнутые, но негустые подушки. Растение слабоопушенное, стебли тонкие, но достаточно крепкие. В отличие от предыдущих видов листья супротивные, лан-

цетные, длиной до 5 см. Цветки карминные, розовые, реже белые, диаметром до 1,5 см, в густых многоцветковых кистях (выше листьев на 5-10 см). Цветет в мае-июне.

**Флокс Ругелли** (*Phlox rugelli*). Получен в результате скрещивания ф. прелестного и ф. шиловидного. Образует широкий ковер высотой до 12 см. Цветки пурпурно-голубые, в соцветиях.

**Флокс снежный** (*Phlox nivalis*). Очень похож на ф. шиловидный, но более компактный. Цветки от пурпурных до розовых. В настоящее время мы изучаем его сорта, полученные из Литвы ('*Камла*', '*Джилл Александер*', '*Нивея*').

**Флокс полегающий** (*Phlox procumbens*). Получен путем межвидового скрещивания ф. побегоносного и ф. шиловидного. Ботанически занимает промежуточное положение между растениями обеих групп. Ковер высотой до 12-15 см обычно несколько шире (до 80 см в диаметре) и выше, чем у флокса шиловидного. Наиболее известны следующие сорта.

'Розеа' ('*Rosea*'). Густо-розовый.

'Миллстрим' ('*Millstream*'). Темно-розовый с белым центром и красноватым глазком.

**Флокс раздвоенный** (*Phlox bifida*, син. *Ph. stellaria*). Распространенное неприхотливое ковровое растение. Цветки в кистях самой различной окраски от белой до темно-лиловой. На богатой влагопроницаемой почве некоторые формы подходят для окаймления цветников. Можем рекомендовать следующие сорта:

'Блю Форм' ('*Blue Form*'). Синий.

'Колвинг Уайт' ('*Colving White*'). Чисто-белый.

'Петтикоут' ('*Petticoat*'). Розовый.

'Старбрайт' ('*Starbrite*'). Бледно-голубой, компактный.

Все флоксы первой группы предпочитают хорошо дренированную, достаточно увлажненную, легкую суприну или супесчаную почву и солнечное место. Неплохо переносят кратковременное иссушение земли. После 3-5 лет выращивания на одном месте почва истощается, и посадки следует обновить. Растения, особенно вечнозеленые, могут выпадать в суровые зимы, их необходимо прикрывать лапником и дубовым листом. Наиболее морозостоек ф. шиловидный, который легко отрастает весной даже после значительных повреждений от морозов.

Сорта рекомендуем размножать только зелеными черенками — сразу после цветения и до августа. Позже укоренение тоже возможно, но молодые растения не успевают достаточно развиться и окрепнуть, плохо зимуют и обычно погибают от выпирания.

В искусственном тумане укоренение длится 2 недели, выход составляет 100% (специальные режимы поливов не требуются).

Можно черенковать непосредственно в грунт или в холодный парник без "тумана", но с обязательной притенкой от прямых солнечных лучей и ежедневным поливом. Это самый выгодный способ размножения с выходом посадочного материала 80-90%.

В принципе реально и ранневесеннее размножение. Но поскольку флокс цветет на верхних приростах текущего года, которые в данном случае идут на черенки, то цветение маточного растения значительно ослабляется, а его внешний вид портится. Укореняемость при этом гораздо ниже.

Для видов возможно семенное размно-

жение. Что же касается деления куста, то мы рекомендуем его только для флокса шиловидного (остальные довольно болезненно переносят эту процедуру).

Вторая группа — это великолепные лесные почвопокровные растения, которым необходимы влажные, богатые гумусом почвы в полутени. В саду они очень неприхотливы и идеально растут между кустами или высокими тенелюбивыми многолетниками.

**Флокс растопыренный** (*Phlox divaricata*, син. *Ph. adsurgens*, *Ph. canadensis*). Произрастает в Канаде и США (от Квебека до Флориды) в светлых лесах с не слишком сухими почвами. Цветки диаметром около 2 см собраны в кисти (до 10 шт.). Они очень приятного голубовато-сиреневого оттенка с темным глазком и выемчатыми лепестками, издают нежный аромат. Растение имеет тонкие полегающие стебли, но верхушка его направлена вверх. На рыхлых (но не сухих) почвах в узлах побегов обычно образуются придаточные корни. Листья яйцевидно-заостренные, длиной до 5 см, жестковатые.

Ф. растопыренный хорошо растет как на солнце, так и в тени. Он настолько неприхотлив, что его шуточно называют "растением для лентяев". Цветет поздней весной и ранним летом дольше, чем флоксы первой группы. Сорты обладают более сильным ростом, чем исходный вид, высота их достигает 40 см, а цветки крупнее. Культура выращивается также в горшках и на срезку (возможна выгонка даже в холодных парниках в конце марта). Из нашей коллекции можем рекомендовать следующие сорта.

'Блю Дримз' ('Blue Dreams'). Лавандово-голубой, душистый, разрастается сильно.

'Чатагучи' ('Chattahoochee'). Густолиловый с красновато-пурпурным глазком. Отличается компактностью. Не всегда легок в выращивании, но иногда на богатых почвах удается отлично.

'Клаудз оф Перфюм' ('Clouds of Perfume'). Лавандовый, очень ароматный.

'Дириго Айс' ('Dirigo Ice'). Сильно разрастающийся, с крупными кремоватыми цветками.

'Лапахамии' ('Laphamii'). Темно-фиолетовые длиннотрубчатые цветки имеют закругленные лепестки.


**Флокс побегоносный, или ползучий** (*Phlox stolonifera*, син. *Ph. reptans*). На востоке Северной Америки встречается во влажных горных долинах. Высота около 10 см, вместе с соцветиями 25 см. Лежачие стебли укореняются в узлах, и в этом месте также появляются побеги. Может занимать большие площади. Поздней весной над зеленым ковром появляются тонкие, но жесткие прямостоячие цветоносы, несущие по 5-10 кистей. Цветки в диаметре 2 см, от лавандовых до фиолетовых или белые.

Сорта превосходно себя чувствуют на богатых почвах, которые никогда не должны пересыхать. Переносят частичную тень.

'Блю Ридж' ('Blue Ridge'). Очень популярен на протяжении многих лет. Яркий лавандово-синий. Цветет в июне-июле, предпочитает затенение и богатые почвы. Разрастается сильно. Его вариации по окраске — розовый 'Пинк Ридж' ('Pink Ridge') и белый 'Уайт Ридж' ('White Ridge').

'Ариан' ('Ariane'). Лучший чисто-белый сорт с округлыми соцветиями.

Флоксы второй группы прекрасно размножаются делением весной и в конце августа-начале сентября, а при достаточном ув-



Ф. побегоносный 'Ариан'



Ф. Дугласа 'Бутманс Вэрайти'



Ф. Дугласа 'Эмералд Кашн'



Ф. раздвоенный


Фото Е. ПИМАНОВОЙ




Ф. растопыренный



Ф. растопыренный 'Лапахамии'



Ф. растопыренный 'Вэгон Уил'




Ф. растопыренный 'Чатагучи'



Ф. шиловидный 'Майори'

Снимки сортов — Гарденс Энциклопедия оф Планта энд Флоуэрс, Англия.

Фото В. КОЛЕСНИКА



лажнении — в течение всей вегетации. Однако в цвету их лучше не беспокоить.

Отцветшие растения хорошо черенкуются зелеными верхушечными побегами с 2-3 листьями (в "тумане" процент укоренения близок к 100, а на разводочных грядах с притенкой и хорошим увлажнением — 80-90).

**И. ЖУКОВА,**  
ботаник.

**И. ДОЛИНКА**  
инженер зеленого строительства  
Фирма "САЛИКС-ДИЗАЙН", Москва